

Sjeldne fugler i Buskerud 2004

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Av Steinar Stueflotten

Antall registrerte funn i 2004 var lavere enn i de to foregående årene. Også forekomsten av spesielle sjeldenheter var moderat. Likevel ble det gjort flere interessante funn, bl.a. av sjeldne sjøfugler under en stormperiode i slutten av september. Det ble registrert og godkjent to nye arter for Buskerud derav en fra 2002.

Saksbehandling

Denne rapporten er basert på ca. 410 registrerte observasjoner av 75 arter og en hybrid. Dette er færre registreringer enn i de to foregående årene, mens antall arter er omtrent det samme som tidligere. Bare 18 av funnene er fra perioden før rapporteringsåret 2004 (inkludert 4 ikke godkjente funn).

LRSK/NSKF har i forbindelse med denne rapporten behandlet 34 godkjenningssaker. Av disse er 10 saker ikke godkjent, mens en sak er plassert i kategorien avventes. 3 nye saker fra perioden er blitt oversendt NSKF for godkjenning: sabinemåke (2 funn) og halsbåndfluesnapper. Vi har mottatt tilbakemelding fra NSKF om at følgende observasjoner er godkjent: hybrid stokkand x brunnakke (2003), sabinemåke (2004) og halsbåndfluesnapper (2002), mens observasjoner av svarthalsdykker (2003), skrikørn (2003) og busksanger (2001), ikke ble godkjent. Vi venter fortsatt på NSKFs godkjenning av en observasjon til av sabinemåke i 2004. Totalt utgjør andelen av funn som ikke er godkjent, 29% av totalt antall ferdigbehandlede godkjenningssaker. Dette er noe høyere enn i de siste årene. 38% av godkjenningssakene var dokumentert med fotobelegg, jamført ca. 30% i de tre foregående årene.

LRSK har avholdt ett møte i 2004, ingen i 2005. Ut over dette har saksbehandlingen skjedd vha telefon, epost og brev. LRSKs arbeid avhenger av god tilgang på observasjoner. Derfor er det viktig at flest mulig sender inn sine observasjoner av sjeldne arter, enten ved å gjøre disse tilgjengelige på Internett, eller ved å sende dem direkte til LRSKs sekretær. LRSK forbeholder seg retten til å vidererapportere funn som observatøren(e) allerede har publisert andre steder. For arter som krever dokumentasjon, er det viktig at observatøren gir en så fylldig beskrivelse av fuglen og dens adferd som mulig, slik at forveksling med andre arter kan utelukkes. En oversikt over hvilke arter som skal rapporteres og hvilke som skal beskrives, finner du bakerst i denne rapporten.

Vi takker alle rapportørene som har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne arters forekomst i fylket oppdatert, og til nok en fylldig årsrapport fra LRSK.

Noen hovedtrekk fra forekomsten i 2004

Fugleåret 2004 i Buskerud var omtrent på det normale, men antall rapporterte funn av sjeldenheter gikk noe ned. En kraftig stormperiode i september førte et stort antall sjøfugler inn mot kysten og inn i Oslofjorden, bl.a. ble det sett mange havhester, alkefugler, sjeldne måkearter og flere joarter i dagene 14.-22. september. Også Buskerud fikk sin del av disse sjeldenheterne: havhest (funn nr.8), storjo (funn nr.6 og 7), flere dvergmåker, sabinemåke (funn nr.2), polarlomvi (ny art) og teist. Andre spesielle funn fra 2004 som bør fremheves, er: gulnebbblom (funn nr.3), snøgås (funn nr.3), mandarinand (funn nr.8), fjellmyrløper (funn nr.2), og trelerke (funn nr.9). Hva gjelder nattsangere ble det observert færre vaktler, vannrikser, myrrikser og åkerrikser enn i 2003, mens antall nattravner, gresshoppesangere og myrsangere var omtrent som normalt. Også i 2004 ble det gjort hekkefunn av hornedykker og sangsvane i Buskerud. Vinterfunn av stjertand, vandrefalk og jernspurv bør også nevnes.

Tabell 1: Funnstatistikk pr. kommune (inkl. godkjente etter-rapporteringer fra 2002 og 2003).

| Kommune | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------------|------|------|------|
| Drammen | 7 | 7 | 9 |
| Flesberg | 1 | 0 | 1 |
| Flå | 2 | 0 | 2 |
| Gol | 2 | 12 | 7 |
| Hemsedal | 1 | 9 | 3 |
| Hol | 15 | 4 | 7 |
| Hole | 89 | 107 | 52 |
| Hurum | 34 | 32 | 38 |
| Kongsberg | 24 | 16 | 22 |
| Krødsherad | 2 | 0 | 0 |
| Lier | 36 | 50 | 62 |
| Modum | 14 | 10 | 2 |
| Nedre Eiker | 14 | 16 | 17 |
| Nes | 3 | 5 | 1 |
| Nore og Uvdal | 2 | 0 | 2 |
| Ringerike | 98 | 112 | 55 |
| Rollag | 0 | 0 | 0 |
| Røyken | 4 | 5 | 7 |
| Sigdal | 0 | 2 | 1 |
| Øvre Eiker | 109 | 118 | 99 |
| Ål | 7 | 21 | 12 |

Kommuneoversikten (tabell 1) viser antall funn per kommune i de tre siste årene. Det er fortsatt Øvre Eiker som topper lista. En halvering av antall registreringer i Ringerike og Hole, samt markert nedgang i Modum,

tyder på en betydelig lavere feltinnsats i dette området i 2004. I Lier derimot økte antall registrerte funn, noe som førte Lier med Linnestranda helt opp på 2. plass på lista.

Endringer i rapporteringslista

Polarlomvi og halsbåndfluesnapper er føyd til lista.

Ny oppdatert rapporteringsliste fins bakerst i rapporten.

Oppbygging av rapporten

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som tidligere. Opplysningene i artsgjennomgangen settes opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn). R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever beskrivelse av funn, mens NSKF betyr at funnet er godkjent av NSKF, (5) år, (6) kommune i alfabetisk rekkefølge, (7) antall individer (ikke angitt hvis 1), (8) kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er), (11) * bak dato angir positivt belegg, og en parentes med symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis den er innsamlet og skinnlagt/utstoppet), (12) navn på den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører angis samtlige, ved flere enn tre observatører angis rapportør/hovedobservatør), (13) kommentarer til observasjonen(e). Her er det innført en forenkling i forhold til tidligere rapporter, idet hekke- og overvintringsområdet nå bare angis i spesielle tilfeller, og funnkommentarene ellers er noe mer begrenset.

For noen arter er det innrapportert mange funn. Arter med fem eller flere funn er derfor presentert i tabellform i kronologisk rekkefølge for å spare plass. Disse artene forekommer normalt temmelig regulært i fylket. For kortnebbgås er ikke alle funnene gjengitt av plasshensyn, kun et sammendrag av funnmengden. Hekkefunn er angitt med (H) i tabellene.

Antall oppgitte funn/individer gjelder i utgangspunktet bare funn som er innrapportert til og godkjent av LRSK. For flere underrapporterte arter gir funnstatistikken følgelig ikke et helt korrekt uttrykk for antall kjente funn av arten i Buskerud.

Opplysninger om utbredelse til artene er i hovedsak hentet fra Handbook of the Birds Europe, the Middle East and North Africa – the Birds of the Western Palearctic (Cramp et.al. 1977-1994) og Norsk Fugleatlas (Gjershaug m.fl. 1994).

Godkjente funn og rapporteringsarter 2004

Smålom *Gavia stellata* (? – 7/15) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-----------|--------------|----------------------|-------------------|
| 08.04. | 2 | Frognøya, Hole | K.Myrmo, J.L.Hals |
| 18.04. | 2 | Gomnes, Hole | K.Myrmo, J.L.Hals |
| 15-19.05. | 3 | Vassfjorden, Ål | E.Mikalsen |
| 25.05. | 1 | Henstjern, Ringerike | B.H.Larsen |
| 13.06. | 3 | Varaldsetvatnet, Hol | S.Sannes |
| 21.06. | 2 ad (H) | Uspes., Ål | R.Solvang |
| 20.10. | 1 ad + 1 juv | Verket, Hurum | E.Gates |

Arten hekker spredt i nordfylket, og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden i siste halvdel av april til medio mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.04. (9 år). 08.04. er tidligste ankomst til nå. Sjelden å se på høsttrekket.

Gulnebbom *Gavia immer* (2/2 – 1/1)

2004 HURUM: utenfor Filtvet 15.05. (E.Gates)

Arten er svært sjelden å se i Oslofjorden. Individet ved Filtvet, som var i sommerdrakt, ble sett flere steder i ytre Oslofjord medio mai.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (>100 - 7/11) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 15.01. | 2 | Drammenselva, Åmot, Modum | B.H.Larsen |
| 27.04. | 1 | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 02.10. | 2 | Miletjern, N.Eiker | S.Stueflotten |
| 02.10. | 1 | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård |
| 08.10. | 1 | Juveren, Ringerike | K.Myrmo |
| 11-24.10. | 1 2 ind 19/10 | Fiskumvannet, Ø.Eiker | T.Bakken, J.T.Bollerud, B.T.Bollerud |
| 12.-24.10. | 1 | Linnestranda, Lier | G.Acklam, B.Ellingsen, m.fl. |
| 26.10. | 1 | Eikredammen, Hemsedal | S.Sannes |
| 30.10.-01.11. | 2 | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård, B.Ellingsen |

Toppdykker *Podiceps cristatus* hekking R

2004 HOLE: 1 rugende par Vik 20.07. (K.Myrmo), og minst 2 vellykkede hekkinger i Steinsvika, (3+1 juv 05.09.) (K.Myrmo).

ØVRE EIKER: Fiskumvannet, minst 1 par fikk frem 3 unger (S.Stueflotten m.fl.).

Horndykker *Podiceps auritus* (? – 7/13) R
 2003 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 19.09.
 (K.A.Dokka)

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 17.04. | 4 | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård, S.Stueflotten |
| 20.04. | 1 | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 17.05. +29.05. | 2 ad | Uspes.1 Golsfjellet, Gol | S.Sannes |
| 23.06. | 2 ad +1 pull | Uspes.2 Golsfjellet, Gol | R.Solvang |
| 21.08. | 1 juv | Fiskumvannet, Ø.Eiker | S.Stueflotten |
| 27.08. +29.08. | 1 juv | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 28.08. | 1 | Fiskumvannet, Ø.Bakken | L.Palmstrøm, T.Bakken |
| 12.09. | 1 juv | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 17.10. +24.10. | 1 | Nordfjorden, Ringerike | K.Myrmo |

Arten sees regelmessig i sørfylket på vårtrekket (medio april - mai) og høsttrekket (august - november). 1-2 par har hekket på Golsfjellet de siste tre årene.

Havhest *Fulmarus glacialis* (7/12 – 1/10) R
 2004 HURUM: 10+ Storskjær 21.09. (H.E. Karlsen,
 E.Gates), 3 utenfor Verpen 22.09. (R.E.
 Andersen).

Arten besøker av og til ytre Oslofjord, og er sett noen ganger utenfor Hurumlandet. Mye havfugl i Oslofjorden i perioden 14.-22.09.2004, deriblant flere havhester.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* vinterfunn R
 2004 HOLE: 1 Steinsvika 05-19.12. (K.Myrmo).

I tillegg til vinterfunnet ovenfor, kan vi nevne at vårtrekket i 2004 startet 18.03. Dette er tidligste start til nå. Fra 28.03. og utover i april gikk det et jevnt trekk av storskarv nordvestover gjennom Buskerud. Den siste flokken trakk over Linnestranda 24.04. Til sammen ble det registrert 21 flokker med litt over 2000 ind på vårtrekket i 2004, men dette er nok bare en del av det totale antallet som trekker gjennom Buskerud. Av mer spesielle innlandsfunn kan vi nevne 1 juv som 05.10. rastet i Urevassfjorden i Hol, 1000 moh på grensa til Sogn og Fjordane (M.O.Furuseth).

Gråhegre *Ardea cinerea* (13 - 1) hekking R
 2004 RINGERIKE: minst 1 par hekket i granholtet på Snyta (S.Stueflotten).

Sangsvane *Cygnus cygnus* sommerfunn/hekking R
 2003 GOL: Lysern 29.05. (S.Sannes).
 2004 NES: 2 ad + 3 juv og 2 uklekte egg på uspesifisert hekkeplass 12.06. (S.Sannes).

RINGERIKE: 1 ind Nordfjorden 27.06.
 (K.Myrmo).
 ØVRE EIKER: 1-3 ind jevnlig på Fiskumvannet hele sommeren (S.Stueflotten, m.fl).

Arten observeres nå årlig om sommeren i Buskerud, bl.a. i Fiskumvannet. Mye tyder på at arten nå har etablert seg som fast hekkefugl i fylket. Ett hekkefunn i 2004.

Sædgås *Anser fabalis* (23/148 – 0/0)
 2003 ØVRE EIKER: 4 ad + 2 juv Fiskumvannet
 25.11. (A.Olsen).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene både vår (april - medio mai) og høst (ultimo sept. – medio nov.) i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet, sjelden ellers.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* R
 Under vårtrekket i 2004 ble arten observert fra 01.04. til 13.05. Gjennomsnittlig ankomstdato for de 7 foregående årene har vært 07.04. Vårtrekket i 2004 hadde dårligere dekning enn tidligere år. Bare 3.100 ind ble registrert mot >10.000 ind tidligere år. 21.04. passerte det ca. 150 kortnebbgæss med en snøgås i plogen over Fiskumvannet kl.14.15 (T.Bakken). Disse landet på Karlsrudtangen kl.14.52 (V.Ree). Den samme flokken ble også observert over Gjernerstangen ved Risør kl.12.20 (T.Helleren). Med en avstand i luftlinje på 160 km, gir dette en flygehastighet på 63 km/t. Høsttrekket pågikk fra 14.09. til 28.10. Det ble registrert til sammen minst 2.500 ind på trekk gjennom Ringerike, Hole, Øvre Eiker, Lier og Kongsberg. Også dette er færre individer enn tidligere.

Tundragås *Anser albifrons* (13/16 – 1/5)
 2004 HOLE: 4 ad + 1 2K Sørum, Steinsletta 27-28.03.
 (K.Myrmo, J.L.Hals).

Arten observeres nesten årlig i trekketidene vår (april) og høst (ultimo september – medio november), hyppigst i Nordre Tyrifjorden, sjelden ellers. De fem individene som beitet på en høsthveteåker på Steinsletta, er de tidligste som er observert i Buskerud til nå.

Grågås *Anser anser* hekking R
 2004 HURUM: 2 kull sør på Hurumlandet 16.05.
 (R.E. Andersen, J.E.Nygård).
 NEDRE EIKER: 4 kull med til sammen 18 pull
 Mjøndalen 06.06. (S.Stueflotten).

Snøgås *Anser caerulescens* (2/2 – 1/1)
 2004 RINGERIKE: Karlsrudtangen 21.04. (V.Ree,
 V.Bunes, K.Myrmo).
 ØVRE EIKER: samme ind ptN Fiskumvannet
 21.04. (T.Bakken).

(Høyarktisk deler av NØ-Sibir, Nord-Amerika og Grønland. Uklar status i Europa da mange funn dreier seg om rømte og utsatte fangenskapsfugler som også har hekket i flere land). Arten sees av og til sammen med kortnebbgjess på vårtrekket. Dette individet ble sett i en flokk på 150 kortnebbgjess som passerte over Fiskumvannet og landet på Karlsrudtangen en halv time seinere. Snøgåsa var ringmerket (V.Bunes).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* (41/97 – 11/31) **R**

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| 06.04 | 2 | Mjøndalen, N.Eiker | T.Bakken |
| 14..04. | 2 | Nordfjorden, Ringerike | O.H.Kristiansen |
| 28.04. | 4 | Linnesstranda, Lier | J.E.Nygård |
| 03.05. | 2 | Linnesstranda, Lier | E.Gates |
| 15.05. | 1 | Storskjær, Hurum | R.E.Andersen |
| 16.05. +29.05. | 1 par (H) | Høvikskjæra, Røyken | R.E.Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten |
| 29.05. | 4 | Geitungholmen, Røyken | R.E.Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten |
| 29.05. | 2 | Sundbyholmene, Røyken | R.E.Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten (M.Bergan) |
| (mai) 03- 06.06. | (2 par) 2 | Drammenselva, Mjøndalen, N.Eiker | C.Mikalsen, S.Stueflotten |
| 06.06. | 2 | Linnesstranda, Lier | S.Stueflotten |
| 28.08. | 2 ad | Storskjær, Hurum | E.Gates |
| 19.09. | 5 | Sandtangen, Nordfj, Ringerike | K.Myrmo |

Antall observasjoner av hvitkinngås har økt mye i Buskerud i seinere år, og arten har nå etablert seg som fast hekkefugl i Oslofjorden. Det hekker nå flere par på holmer og skjær langs kysten av Røyken og Hurum.



Hvitkinngås, Linnesstranda juni 04. Foto: S.Stueflotten

Gravand *Tadorna tadorna* (? – 4/12) innlandsfunn **R**

2004 HOLE: 2 Nordfjorden Ø 31.03. (J.T.Fossum, C.Lundström), 2 Nordfjorden Ø 11.05. (J.T. Fossum, C.Lundström, M.Lundström). RINGERIKE: 8 Nordfjorden 25.03. (K. Myrmo), 2 Nordfjorden 27.03. (K.Myrmo).

ØVRE EIKER: Fiskumvannet 17.04. (B.T. Bollerud, J.T.Johnsen, R.Holmen), Fiskumvannet 13.06. (B.Ellingsen).

Årviss om våren i Tyrifjorden og Fiskumvannet. Arten ankommer kysten av Hurum og Røyken medio mars.

Mandarinand *Aix galericulata* (7/7 – 1/1) **R**

2004 KONGSBERG: hann Kongsberg sentrum 11.04. (E.Gates) til 08.10. (F.T.Brandbu).

Denne hannen hadde tilhold i Lågen i Kongsberg sentrum hele sommeren. Også sett samme sted i 2003. Funnet plasseres i kategori C (forvillede arter som reproducerer i vill tilstand).

Brunnakke *Anas penelope* hekking **R**

2004 RINGERIKE: 2 hunner med 5 og 4+ pull Solbergstjern, Tyrstrand 06.07. (V.Ree).

Arten hekker spredt i nordfylket, sjelden ellers. Dette er første påviste hekking i Tyrifjords-området.

Hybrid stokkand x brunnakke *Anas platyrhynchos x penelope* (1/1 – 0/0) **NSKF**

2003 HURUM: 1 ad M Verket 14.04.* (F) (E.Gates).

Individet viste artskarakterer til både stokkand hann og brunnakke. Hybrider mellom disse to artene observeres av og til i Norge. Dette er første funn i Buskerud.

Snadderand *Anas strepera* (18/35 – 3/7)

2004 HOLE: 2M+1F Steinsvika 18-27.04.(B.H. Larsen, K. Myrmo) (kun 1 par 18. og 27.04.). LIER: 2M+1F Linnesstranda 15.04.* (F) (J.E. Nygård, R.E.Andersen). NEDRE EIKER: 1M Drammenselva ved Krokstadelva 02.10.* (F) (S.Stueflotten).



Snadderand, Krokstad, oktober 04. Foto: S.Stueflotten.

Arten observeres nesten årlig på både vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (sept-okt). De tre individene som

ble sett på Linnestranda 15.04. og i Steinsvika et par dager seinere, kan muligens være de samme. Arten ble også sett på disse to lokalitetene i april 2002 og 2003.

Stjertand *Anas acuta* (3/3 – 1/1) vinterfunn/hekk. **R**

2004 DRAMMEN: hann Drammenselva 21.02.
(J.Gylder, G.Ersdal).
HOL: 1 hunn m/6 unger Budalsvatnet 06.07.
(L.E.Furuseth).

Vinterfunn av stjertand er sjeldne i Buskerud (angitt antall på artslinjen gjelder bare vinterfunn). Fåttallig hekkefugl i nordfylket. LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn.

Knekkand *Anas querquedula* (? – 6/15) **R**

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|
| 16.04. | 1M+1F | Linnestranda, Lier | S.Landsverk |
| 18.-27.04. | 1-5 (3M+2F) | Juven, Ringerike | K.Myrmo, J.L.Hals |
| 18.04.+20.04. | 1M | Synneren, Ringerike | K.Myrmo, V.Bunes |
| 19.04. | 1M+1F | Fiskumvannet, Ø.Eiker | S.Landsverk, m.fl. |
| 28.04.-01.06. | 1-3 (2M+1F) | Fiskumvannet, Ø.Eiker | J.T.Bollerud, B.T.Bollerud m.fl. |
| 25.05. | 1M+1F/2 pull | Fiskumvannet, Ø.Eiker | J.T.Bollerud |
| 29.04. | 1M | Nordfjorden, Ringerike | K.Myrmo |
| 22.05. | 1M | Steinsvika, Hole | S.Stueflotten |
| 04.08. | 1F | Linnestranda, Lier | E.Gates |

Arten observeres regelmessig men fåttallig, spesielt om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 25.04. (24 år). Det har lenge vært mistanke om at arten har hekket i Buskerud. Observasjonen i Fiskumvannet 25.05. er første sikre bevis på dette.



Knekkand, Fiskumvannet, mai 04. Foto: S.Stueflotten

Skjeand *Anas clypeata* (? – 9/11) **R**

2003 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 09.11.
(B.T.Bollerud)

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 18.04.+21.04. | 1 par | Steinsvika, Hole | K.Myrmo, J.L.Hals, B.H.Larsen |
| 18.04. | 1 | Synneren, Ringerike | J.L.Hals |
| 20.04.+27.04. | 1M | Juven, Ringerike | K.Myrmo |
| 24.04. | 1M | Steinsvika, Hole | K.Myrmo, J.L.Hals, V.Ree, m.fl. |
| 05.05. | 1 par | Linnestranda, Lier | G.Gisholt |
| 05.06. | 1M | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård, B.Ellingsen |
| 08.06. | 1M | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.Steinsvåg, J.T.Bollerud |
| 04.09.+09.09. | 1 hunnf. | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, H.J.Hovelstad m.fl. |
| 02.10.-12.10. | 1 hunnf. | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, S.Stueflotten, m.fl. |
| 24.10. | 1 hunnf. | Synneren, Ringerike | K. Myrmo |
| 05.11 | 1 | Fiskumvannet, Ø.Eiker | J.T.Bollerud |

Arten observeres fåttallig men regelmessig, spesielt i trekktidene vår (medio april – mai) og høst (sept – okt), gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (21 år). Noen av funnene kan dreie seg om de samme individene. 05.11. er blant de seineste observasjonene i fylket til nå.

Taffeland *Aythya ferina* (? – 5/9) **R**

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|--------|--------|-------------------------|------------------------------------|
| 19.04. | 1M+1F | Fiskumvannet, Ø.Eiker | S.Landsverk, J.T.Bollerud, A.Nævra |
| 03.09. | 1M | Fiskumvannet, Ø.Eiker | F.Gregersen |
| 25.09. | 1M+1F | Vik, Hole | K.Myrmo |
| 02.10. | 3 | Åsa/Steinsfjorden, Hole | K.Myrmo |
| 15.10. | 1M | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård |
| 31.10. | 1M+1F | Fiskumvannet, Ø.Eiker | B.R.Skullestad, B.T.Bollerud |

Arten har vært observert regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden både vår (medio april – medio mai) og høst (medio sept – medio nov), sjelden ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (18 år).

Havelle *Clangula hyemalis* (? – 5/15) **R**

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 11.05. | 7 | Nordfjorden Ø, Hole | J.T.Fossum, M.Lundström |
| 25.05. | 1F | Henstjern, Ringerike | B.H.Larsen |
| 21.10. | 1 juv | Hemsila, Hemsedal | S.Sannes |
| 30.10. | 3M | Lågen v/Hostvet, Kongsberg | F.T.Brandbu |
| 31.10. | 1M+2 hunnf. | Åsa, Steinsfjorden, Ringerike | K.Myrmo |

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, ellers fåttallig og sporadisk både i lavlandet og i kyststrøk vår (april-mai) og høst (oktober-november).

Svartand *Melanitta nigra* vinterfunn R

2004 HURUM: 6 Tofte 01.01. (R.E.Andersen),
1F Verket 03.01. (E.Gates), 4 hunnf. Verket
08.12. (E.Gates).

Sjelden vintergjest, hyppigst rundt Hurumlandet.
Hekker i fjellet i nordfylket. Verdt å nevne er også 150
ind observert i Nordfjorden, Hole 11.05. (J.T.Fossum
m.fl.).

Sjørre *Melanitta fusca* (? – 6/30) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 21.06. | 8 | Kråkhamarvatnet, Ål | R.Solvang |
| 21.06. | 4 | Breavatnet, Ål | R.Solvang |
| 14.08. | 3 kull (3F/15 juv) | Kråkhamarvatnet, Ål | S.Sannes |
| 05.10.- 25.10. | 1 | Linnesstranda, Lier | R.E.Andersen, J.E.Nygård, m.fl. |
| 24.10. | 1 par | Nordfjorden, Ringerike | K.Myrmo |
| 24.10. | 1M+3F | Svendsrudvika, Hole | K.Myrmo |
| 08.12. | 1M | Verket, Hurum | E.Gates |

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, og observeres
sporadisk i lavlandet utenom hekketida og på kysten om
høsten.

Lappfiskand *Mergus albellus* (91 – 5/9) R

2002 NES: Nesbyen 04.05. (S.Sannes).

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|----------|--------------------------------|---|
| 13.01. | 2M+1F | Begna v/Bergsund, Ringerike | B.H.Larsen |
| 28.03. | 1 par | Nordfjorden, Ringerike | O.H.Kristiansen |
| 01.04. | 1F | Nordfjorden, Ringerike | K. Myrmo |
| 10.04.- 13.04. | 1M | Fiskumvannet, Øvre Eiker | K.A.Dokka, J.T.Johnsen, m.fl. |
| 31.05. | 1 par | Simoa v/Albjørk, Sigdal | B.Engelstad, T.Mesna |
| 12.10.- 23.10. | 1 hunnf. | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud, B.T.Bollerud, B.Ellingsen |

Arten overvintrer regelmessig, oktober – april. Funn så
seint som 31.05. er sjeldne. Færre observasjoner i 2004
enn i de to foregående årene.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (16/16 – 1/1)

2004 RINGERIKE: 1 ad Ask 24.10. (S.Bergan).

Arten observeres nå årlig i nedre Buskerud. De fleste
funn blir gjort i vinterhalvåret (november - mars).
Oversikten er dessverre mangelfull fordi flere funn ikke
blir innrapportert til LRSK, eller ikke blir godkjent pga
mangelfulle beskrivelser.

Sivhauk *Circus aeruginosus* (? – 7/9) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|-----------------|------------------------------|---|
| 17.04. | 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, J.T.Johnsen, R.Holmen |
| 18.04.- 19.04. | 1M 2K | Fiskumvannet, Øvre Eiker | L.Palmstrøm, S.Stueflotten, m.fl. |
| 18.04. | 1 hunnf. | Synneren, Ringerike | K.Myrmo |
| 20.04. | 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | O.Gilde |
| 21.04. | 1F 2K | Steinsvika, Hole | B.H.Larsen |
| 04.05. | 1M 2K + 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud |
| 07.05.- 08.05. | 1M 2K | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud, m.fl. |
| 07.05.- 08.05. | 1F | Linnesstranda, Lier | B.Ellingsen, S.Stueflotten |
| 12.05. | 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud, T.Andersen |
| 13.05. | 1M | Linnesstranda, Lier | E.Gates |
| 20.05. | 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | S.Stueflotten, B.T.Bollerud, m.fl. |
| 30.05.- 07.06. | 1F | Fiskumvannet, Øvre Eiker | S.Dale, m.fl. J.T.Bollerud |
| 12.06. | 1M+1F + 1 2K | Fiskumvannet, Øvre Eiker | M.Sjøblom, E.Mikalsen |
| 20.06. | 1M 2K | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 13.08. | 1 juv | Juveren, Ringerike | K.Myrmo |
| 27.08. | 1 juv | Steinsvika, Hole | K.Myrmo |
| 28.08. | 1 hunnf. | Fiskumvannet, Øvre Eiker | L.Palmstrøm, T.Bakken |
| 29.08. | 1 juv | Karlsruvtangen, Ringerike | K.Myrmo |
| 04.09.- 05.09. | 1 hunnf. | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, m.fl. S.Stueflotten |
| 09.09. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | H.J.Hovelstad |

Et nytt godt år med mange observasjoner. Flere av
observasjonene dreier seg med stor sannsynlighet om de
samme individene. Gjennomsnittlig ankomstdato:
27.04. (16 år), men en uke tidligere i seinere år.

Myrhauk *Circus cyaneus* (? – 10/11) R

2003 HEMSEDAL: 1F Hemsila 14.05. (S.Sannes).

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 09.04. | 1M | Røyse, Hole | V.Ree |
| 13.04. | 1M | Fiskumvannet, Øvre Eiker | M.Hunn |
| 23.04. | 1M ad | Hemsila, Gol | S.Sannes |
| 09.05. | 1M | Hemsila, Hemsedal | S.Sannes |
| 15.05.- 16.05. | 1M | Leveld, Ål | B.Kyrkjedelen |
| 22.05. | 1M | Breidset, Ål | E.Frantzen |
| sommer | 1 hekking | Uspes., Hol | O.Vaagan Slåtten |
| 11.09. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | ukjent |
| 03.10. | 1 | Hvittingfoss, Kongsberg | H.J.Hovelstad |
| 31.10. | 1 juv | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.R.Skullestad, B.T.Bollerud |

Arten hekker fåtallig i fylkets nordlige deler. I nedre deler observeres den fåtallig men regelmessig på vårtrekket (medio april – mai) og høsttrekket (ultimo august – oktober), gjennomsnittlig ankomstdato: 23.04. (25 år), men en uke tidligere i seinere år. 09.04. er blant de tidligste ankomstene til nå.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (23 - 3) lavlandsfunn R

2004 KONGSBERG: 1 ad Kongsberg 03.12. (J.T.Bollerud, Å.Gustavsen).
ØVRE EIKER: 1 subad Eikeren 28.02. (A.Granbakken) og Sf Fiskumvannet 24.04. (T.Bakken, B.T.Bollerud, S.Stueflotten m.fl).

Arten hekker spredt i høyereliggende deler av fylket. Spesielt ungfugler kan av og til sees på streif i lavere-liggende deler av fylket, særlig i vinterhalvåret. Bare et fåtall funn blir innrapportert.

Lerkefalk *Falco subbuteo* (76/103 – 13/22) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|
| 04.05. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud |
| 27.05. | 1 | Karlsruddtangen, Ringerike | K.Myrmo |
| 13.06. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.Ellingsen |
| 15.06. | 1 | Storøya, Hole | V.Ree, B.H.Larsen, M.Bergan, K.Myrmo |
| 02.07. | 1 | Gomnes, Hole | V.Ree |
| sommer | 1H | Uspes., Kongsberg | (ref. O.F.Steen) |
| sommer | 3H | Uspes., Modum | (ref. O.F.Steen) |
| sommer | 3H | Uspes, Øvre Eiker | (ref. O.F.Steen) |
| 14.07. | 1 ad | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud |
| 11.08. | 1H | Uspes., Ringerike | (ref. O.F.Steen) |
| 28.08.- 29.08. | 2 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | L.Palmstrøm, T.Bakken, F.Brandbu |
| 03.09.- 11.09. | 1-2 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | F.Gregersen, B.T.Bollerud, m.fl. |

Arten har i seinere år blitt et fast innslag i nedre deler av fylket. Etter aktiv leting sommeren 2004, ble arten påvist hekkende på ikke mindre enn 8 lokaliteter, mot tre kjente fra tidligere. Gjennomsnittlig ankomstdato: 04.05. (17 år).

Jaktfalk *Falco rusticolus* (? – 2/3) R

2004 NORE OG UVDAL: 1 unge ringmerket 13.06.* (F) (P.Furuseth, M.O.Furuseth).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 29.08. (F.T.Brandbu).

Arten hekker spredt og fåtallig i fjellet i øvre og midtre deler av Buskerud. Arten er sjelden å se i lavlandet.

Vandrefalk *Falco peregrinus* (3 - 1) vinterfunn R

2004 DRAMMEN: 1F Åskollen 03.02. (K.Aarseth, W.A.Tandberg, B-O.Hagren)

Arten hekker nå flere steder i nedre Buskerud, men er sjelden å se om vinteren. Den 13 år gamle, ringmerkede hunnen hadde havnet i en lysgrav på Åskollen i Drammen etter å ha slått en kråke. Reportasje med bilde i DTBB 04.02.04.

Vaktel *Coturnix coturnix* (? – 3/3) R

2004 KONGSBERG: Nordre Kleppan, Passebekk 21.05. (H.J.Hovelstad), Senning i Lågendalen 06.06. (B.R.Skullestad).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 23.05. (J-I.Vidal).

Arten observeres årlig i nedre deler av fylket fra ultimo mai til primo august. Gjennomsnittlig ankomstdato: 31.05. (12 år). Antall funn er mye lavere enn i 2002 og 2003.

Vannrikse *Rallus aquaticus* (33/39 – 5/5) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|--------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 01.05. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud |
| 30.05. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | S.Dale, m.fl. |
| 06.06. | 1 | Øyen-Lågen, Kongsberg | B.R.Skullestad |
| 03.07. | 1F | Miletjern, N.Eiker | S.Stueflotten |
| 28.08. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | T.Bakken |
| 04.09. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, I.T.Steen, E.Mikalsen |

Arten er blitt observert årlig de siste årene, mai – november, hyppigst ved Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 13.05. (7 år).

Myrrikse *Porzana porzana* (32/39 – 3/3) R

2004 DRAMMEN: Svensedammen 09-12.05. (S.Stueflotten, m.fl.).
HOLE: Onsakervika 03. og 07.06. (V.Bunes)
RINGERIKE: Karlsruddtangen 27-28.05. (V.Bunes).

Noen færre observasjoner i 2004 enn de to foregående årene. Arten ankommer nedre deler av fylket i slutten av mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 22.05. (12 år).

Åkerrikse *Crex crex* (45 – 3/3) R

2002 RINGERIKE: hekking Odden 01.06. (Naturdatabase – Dir. for naturforvaltning).
2004 HOLE: Hundstad, Røyse 09.06. (J.T. Fossum).
KONGSBERG: Nordre Kleppan, Passebekk 08-10.05. (H.J.Hovelstad).
ØVRE EIKER: Hals 07.06. (A.Hals).

Færre observasjoner i 2004 enn de to foregående årene. Arten ankommer normalt Buskerud ultimo mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 25.05. (8 år). 08.05. er tidligste observasjon til nå.

Sivhøne *Gallinula chloropus* (? – 15/33) **R**

2003 RINGERIKE: 1 ad + 2 juv Juveren 28.09. (K. Myrmo).

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 17.04. | 1 | Miletjern, N.Eiker | S.Stueflotten |
| 18.04. | 1 | Synneren, Ringerike | J.L.Hals |
| 24.04.-29.04. | 1-2 | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård, R.E.Andersen |
| 02.05. | 1 | Rudsås Sf Krekling, Kongsberg | F.Gregersen |
| 08.05.-15.06. | 1 ad – 2ad/7 pull | Lahelldammen, Lier | J.Mjåland, S.Stueflotten |
| 21.05. | 1 | Sætre, Hurum | S.Stueflotten |
| 22.05.-23.05. | 1 | Miletjern, N.Eiker | M.Halmrast |
| 23.05. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J-I.Vidal |
| 25.05. | 1 | Hårum, Hole | B.H.Larsen |
| 13.06. | 2 | Miletjern, N.Eiker | S.Stueflotten |
| 02.08. | 1 ad +2 juv | Sætre, Hurum | E.Gates |
| 04.08. | 8+ (ad+juv) | Lahelldammen, Lier | J.Mjåland |
| 10.08. | 1 juv | Steinsvika, Hole | B.H.Larsen |
| 12.08. | 1 juv | Juveren, Ringerike | K.Myrmo |
| 21.08.-02.10. | 1 ad – 2 ad+3 juv | Miletjern, Nedre Eiker | S.Stueflotten |
| 25.08.-27.08. | 1 juv | Linnestranda, Lier | E.Gates, R.E.Andersen |
| 27.08. | 1 juv | Hårum, Hole | K.Myrmo |
| 05.09. | 1 juv | Svensedammen, Drammen | S.Stueflotten |
| 23.09. | 2 ad | Sætre, Hurum | S.Stueflotten |
| 03.10. | 1 ad | Hærstrøm, N. Eiker | S.Stueflotten |
| 03.10.-25.10. | 1-3 juv | Linnestranda, Lier | S.Stueflotten, J.E.Nygård, E.Gates |
| 17.10. | 1 juv | Miletjern, N.Eiker | S.Stueflotten |
| 26.10. | 1 | Lahelldammen, Lier | J.Mjåland |
| 06.11. | 2 | Linnestranda, Lier | B.Ellingsen |
| 17.11. | 1 ad | Åsa, Steinsfjorden, Ringerike | B.H.Larsen |

Arten ankommer normalt i siste halvdel av april og holder seg i vårt område til ut i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.04. (14 år). Hekket på de faste lokalitetene på Sætre og Miletjern, trolig også i Nordre Tyrifjords-området, samt på ny lokalitet i Lahelldammen i Lier. Rekordmange funn i 2004.

Tundralo *Pluvialis squatarola* (26 – 2/2) **R**

2004 HOLE: Sandtangen, Nordfjorden 22.09. (V.Ree).
RINGERIKE: 1 ad Karlsrudtangen 29.08. (K.Myrmo).

Arten opptrer fåtallig og forholdsvis regelmessig på høsttrekket (medio august – primo oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers.



Tundralo, Karlsrudtangen, august 04, Foto: K.Myrmo

Polarsnipe *Calidris canutus* (15 – 1/2) **R**

2004 RINGERIKE: 2 juv Karlsrudtangen 27.08. (K. Myrmo).

Arten opptrer bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket i Buskerud (ultimo juli – primo oktober).

Dvergsnipe *Calidris minuta* (? – 2/2) **R**

2004 LIER: Linnestranda 25.05. (R.E.Andersen).
RINGERIKE: Karlsrudtangen 29.08. (K.Myrmo).

Arten observeres stort sett årlig i nedre deler av fylket i lite antall på høsttrekket (medio august – september), sjelden på vårtrekket (mai).

Temmincksnipe *Calidris temminckii* (? – 5/13) **R**

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|--------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 13.05. | 1 | Linnestranda, Lier | R.E.Andersen, E.Gates |
| 20.05. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | S.Stueflotten, B.T.Bollerud |
| 23.05. | 1+ | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J-I.Vidal |
| 25.05. | 1 | Linnestranda, Lier | R.E.Andersen |
| 26.05. | 7 | Linnestranda, Lier | J.E.Nygård, B.Ellingsen |
| 30.05. | 1 | Linnestranda, Lier | S.Stueflotten |
| 30.05. | 1 | Henstjern, Ringerike | K.Myrmo |
| 03.06. | 3 | Ustedøla, Øf Ustaoset, Hol | T.Breiehagen |

Arten hekker sparsomt i øvre deler av fylket, og observeres sporadisk på vårtrekket (mai) og høsttrekket (medio august – ultimo september) i nedre deler.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea* (19 – 2/2)

2004 LIER: 1 ad Linnestranda 24-25.08.* (F) (E.Gates, G.Acklam, R.E.Andersen).
RINGERIKE: 1 juv Karlsrudtangen 29.08. (K.Myrmo).

Arten observeres sporadisk i lite antall (typisk 1-3 ind) på høsttrekket i nedre Buskerud. De fleste funn er gjort fra medio august til medio september i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet. Dette er første funnet på Linnesstranda siden 1974.

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus* (1/1 - 1/1)
2004 RINGERIKE: 2K+ Henstjern 30.05.* (F)
(K.Myrmo).

Dette er det andre godkjente funnet av fjellmyrløper i Buskerud i nyere tid. Det første ble gjort på Røsshholmstranda 07.08.1992 (B.H.Larsen).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* (? - 2/2) **R**
2004 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 28.08.
(L.Palmstrøm, T.Bakken).
ÅL: Breidset 22.05. (E.Frantzen).

Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud, og ses sporadisk på trekket vår og høst i nedre deler av fylket.

Småspove *Numenius phaeopus* hekking (? - 1/1) **R**
2004 GOL: Halleflæi, Golsfjellet 23.06. (R.Solvang).

Fåtallig hekkefugl i nordfylket. Regelmessig på trekket vår og høst. LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn.

Sotsnipe *Tringa erythropus* (44 - 1/1) **R**
2004 HOLE: Steinsvika 22.06. (B.H.Larsen).

Arten observeres nesten årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (mai) og høsttrekket (august-september). Sommerfunn som dette, er sjeldne.

Steinvender *Arenaria interpres* (19 - 2/2) **R**
2002 HOL: Budalsvatnet (1022 moh!), 01.06.
(T.Furuseth)
2004 HOLE: Småøyene, Steinsfjorden 25.05.
(B.H.Larsen).
RØYKEN: 1 ad Høvikskjæra 29.05. (R.E.
Andersen, J.E.Nygård, S.Stueflotten).

Arten observeres sporadisk i Buskerud, oftest i mai. Funnet i Budalsvatnet på Geilo er det første i nordfylket og i fjellet.

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (? - 4/12) **R**
2004 GOL: 2 Metubba, Golsfjellet 29.05. (S.Sannes).
HOL: 3M+1F Budalsvatnet, Geilo 22.06.
(R.Solvang).
ØVRE EIKER: 3 Fiskumvannet 22.05.
(T.Andersen).
ÅL: 3+ Klypestjørne, Reineskarvet 21.06.
(R.Solvang).

Arten hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, noe også funnene i 2004 viser. Arten sees sjelden på trekket i lavlandet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.05. (10 år)

Jo sp. *Stercorarius sp.* (? - 1/3)
2004 HURUM: 3 1K ved Storskjær 21.09. * (F)
(E.Gates).

De fleste observasjoner av joer i Buskerud gjøres langs kysten om høsten. De tre ungfuglene lot seg ikke med sikkerhet artsbestemme. Både fjelljo, tyvjo og polarjo ble sett i Oslofjorden rundt 20.09. Mest sannsynlig dreide det seg om tre unge tyvjoer.

Storjo *Stercorarius skua* (5/5 - 2/2)
2004 HURUM: 1 ad ptSV utenfor Tofte 21.09.
(E.Gates), 1 ind funnet dødt i sjøen utenfor
Storsand 22.09.* (F) (R.E.Andersen).


Flere storjoer og andre joarter ble observert i Oslofjorden i dagene rundt 20.09. bl.a. en storjo ved Huk i Oslo 22.09. De to funnene kan derfor dreie seg om forskjellige individer.

Dvergmåke *Larus minutus* (21/40 - 2/9)
2004 HOLE: 2 ad + 1 2K Steinsvika 12-16.05.
(V.Bunes, K.Myrmo).
HURUM: 1 ad + 1 2K + 4 1K Nf Storskjær
21.09. (E.Gates).

Arten er blitt observert årlig i Buskerud de siste årene. De fleste funn blir gjort i august-september. Storm i Nordsjøen og Skagerrak hadde blåst en stort antall havfugler inn mot kysten og inn i Oslofjorden i dagene rundt 20.09, deriblant mange dvergmåker. Den 19.09. ble det sett hele 16 dvergmåker i fjorden utenfor Holvik i Vestby (AK), flere av disse visstnok også på Hurumsida.

Sabinemåke *Larus sabini* (1/1 - 1/3) **NSKF**
2004 HURUM: 3 1K ved Storskjær 21.09. (E.Gates),
1K Storsand 22.09.* (F) (R.E. Andersen).

(Sirkumpolar høyarktisk utbredelse, overvintrer vesentlig i tropiske strøk). Det første funnet av sabinemåke i Buskerud ble gjort i Tyrifjorden 20-25.09.1997 (V.Bunes, m.fl.). Stormvær i Nordsjøen og Skagerrak i dagene rundt 20.09. førte til en stor invasjon av sabinemåker i Sør-Norge, bl.a. ble minst 6 ind sett ved Håøya 21.09. (ref.: fugler.net). I tillegg til de angitte funnene, avventes NSKFs godkjenning av ett funn til utenfor Filtvet 18.09. Siden det ikke er mulig å skille individene som ble observert utenfor Hurum i dagene 18-22.09., regnes dette som ett funn av 3 individer. Alle individer observert i Buskerud har for øvrig vært 1K fugler. Bildet nedenfor ble tatt v.h.a. en mobiltelefon!



Sabinemåke juv, Storsand, sept.04. Foto: R.E.Andersen

Krykkje *Rissa tridactyla* (? – 2/11) R

2004 HURUM: 10+ ved Storskjær 21.09. (H.E. Karlsen).

KONGSBERG: 1 ind funnet påkjørt ved Hvitvingfoss 28.12. (H.J.Hovelstad).

Arten forekommer trolig relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt etter uværsperioder som den i september 2004. Innlandsfunn er derimot mer sjeldne.

Lomvi *Uria aalge* innlandsfunn (? – 3/5) R

2003 RINGERIKE: 4 Nordfjorden 12.01. (V.Ree).

2004 DRAMMEN: Haugesgate i Drammen 14.10. (O.Gaaserud).

HOLE: 3 SØf Bønnesnes, Tyrifjorden 06.03.

(V.Ree), 1 Vf Frognøya 08.04. (J.L.Hals, K.Myrmo).

ØVRE EIKER: 1 ad Fiskumvannet 09-11.10.

(K.A.Dokka, J.T.Bollerud).

Lomviene som havnet i Tyrifjorden under den store invasjonen høsten 1997, har hatt tilhold der siden. Antallet har avtatt noe for hvert år, og etter vinteren 2003/04 var det bare 3-4 ind igjen. Uten tilførsel av nye individer, vil nok dette fenomenet snart opphøre.

Polarlomvi *Uria lomvia* (0/0 – 1/1)

2004 HURUM: 1 ad Oslofjorden SVf Oscarsborg 05.10. (E.Gates).

(Hekker i kolonier i Arktis og overvinter i tilstøtende havområder). Dette er første bekreftede funn av arten i Buskerud. Fuglen som var i vinterdrakt, svømte sammen med 2 lomvier på Frogn-sida i Akershus før den fløy over til Buskerud-sida av fjorden utenfor Slottet, SVf Oscarsborg. Enkeltindivider av polarlomvi er observert noen få ganger tidligere i Oslofjorden, de fleste om høsten (Dale m.fl. 2001).

Teist *Cephus grylle* (5/6 – 2/2) R

2004 FLÅ: Hangstjern 03.08. (T.Bøhler).

HURUM: 1K Verket 05.10 (E.Gates).

Sjelden art langs kysten av Hurum og Røyken. Enda mer oppsiktsvekkende var observasjonen i Hangstjern i

Flå, 592 moh! Fuglen ble oppdaget idet den stod på en grusvei ca. 5 m fra Hangstjernet. Den fløy opp og landet ute på vannet. Slike innlandsfunn av teist er meget sjeldne i Norge.

Haukugle *Surnia ulula* (? – 3/3) R

2004 ØVRE EIKER: Smebakken, Darbu 07.03.

(J.T.Bollerud, I.Bollerud).

ÅL: Helsingset, Torpo 07. og 19.05.

(E.Frantzen), 1K Fetjastølen 03.08.

(T.Breiehagen, A.M. Monclair).

Arten hekker spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår, sees årlig her, mer sporadisk i sørfylket.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (? – 12/26) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|-------------------|--------|---|--|
| 18.05.+ | 1 | Fukleknatten/ Smiåsen, Kongsberg | H-J.Hovelstad |
| 21.05. | 1 | Gravdalsåsen, Kongsberg | H-J.Hovelstad |
| 23.05.+ 03.06. | 1 | Neslia, Sandsvær, Kongsberg | B.R.Skullestad, S.Stueflotten, B.Engelstad |
| 08.06. | 1 | Slettjellet, Ø.Eiker | S.Stueflotten |
| 08.06.- 09.06. | 2 | Østerudfjellet, Kongsberg | J.T.Johnsen, E.Andersen |
| 12.06. | 2 | Østerud, Øvre Eiker | S.Stueflotten, m.fl. |
| 12.06. | 6+ | Storekleiv-Tryterud Eikeren, Ø.Eiker | S.Stueflotten |
| 13.06. | 6+ | Røstad-Aklangen, Hurum | F.N.Bye, E.Gates, J.Mjåland |
| 14.06. | 2 | Stokker, Hurum | F.N.Bye, E.Gates, J.Mjåland |
| 14.06. | 1 | Dustad, Hurum | F.N.Bye, E.Gates, J.Mjåland |
| 14.06. | 2 | Tronstad, Hurum | F.N.Bye, E.Gates, J.Mjåland |
| 02.07. | 1 | Knivsfjellet, Hurum | E.Gates |
| ca. 28.07. | 2 | V/Rødbyvatnet, Hurum | L.T.Poppe |

De tre siste årene er det gjennomført et eget prosjekt for å kartlegge nattravnens forekomst i Buskerud. Dette har gitt mye ny kunnskap om artens forekomst i fylket. Hurum har trolig en av Norges tetteste bestander av nattravn. I 2004 var det spesielt lokaliteter i Øvre Eiker og Kongsberg som ble undersøkt. Nattravnen ankommer normalt i midten av mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 17.05. (8 år).

Ilsfugl *Alcedo atthis* (45 – 2/2) R

2004 LIER: Linnestranda 01.05. (R.E.Andersen),

17.05. (T.Svorkmo-Lundberg), 24.05.

(B.Ellingsen), 24.08. (G.Acklam) og 11.09.

(R.E.Andersen).

Arten er observert årlig i Buskerud i seinere år. De fleste funn (alle i 2004) er gjort på Linnestranda. Arten ankommer normalt i slutten av april, gjennomsnittlig ankomstdato: 26.04. (9 år).

Dvergspett *Dendrocopos minor* (? - 1) hekking **R**

2004 ØVRE EIKER: 1 ad m/pull i reirhull ved Skotselv i juni (J.T.Johnsen).

LRSK ønsker flere rapporter om hekkefunn for å få en bedre oversikt over denne rødlisteartens utbredelse i fylket.

Trelerke *Lullula arborea* (8/10 – 1/1)

2004 ØVRE EIKER: 1 sy Gulliksrud, Darbu 07-14.04. (J.T.Johnsen, J.Steinsvåg) og 25.05. (J.T.Johnsen)

Arten er blitt observert flere ganger i Kongsberg og Øvre Eiker i seinere år, men er ikke med sikkerhet blitt konstatert hekkende ennå.

Fjellerke *Eremophila alpestris* **R**

2004 HOL: 1 syngende hann ved Tuva 22.06. (R.Solvang, S.Sannes).

Arten hekker spredt i høyfjellet i nordfylket. Arten sees svært sjeldent på trekket i lavlandet.

Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (? – 3/5) **R**

2004 HURUM: Tofteholmen 17.10. (E. Gates, J.Mjåland), 2 Tofte 14.11. (E.Gates, J.Mjåland), 2 Tofte 08.12. (E.Gates).

Arten hekker sparsomt langs kysten av Hurumlandet, og sees heller sjeldent på høsttrekket (september-oktober), kan også overvintre enkelte år på kysten av Hurum.

Jernspurv *Prunella modularis* (2/2-1/1) vinterfunn **R**

2004 LIER: Lahelldammen 04-14.02. (J.Mjåland).

Arten er trekkfugl som sjelden observeres om vinteren her i Norge. LRSK kjenner til to tidligere vinterfunn i Buskerud: 1 ind på Nærnes, Røyken vinteren 1976/77 og 1 ind på Krekling, Øvre Eiker i desember 1977.

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (20 – 3/3)

2004 HOLE: Onsakervika 03.06. (V.Bunes), Domholt 11-18.06. (V.Bunes).
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 31.05.-12.06. (J.T.Bollerud, S.Stueflotten, T.Bakken, m.fl.), Fiskumvannet 28.06. (J.T.Bollerud).

Fiskumvannet er sikreste lokalitet for arten i Buskerud. Arten er observert her både i 2003 og 2004. Observasjonene i Hole kan dreie seg om samme individ. Gjennomsnittlig ankomstdato: 31.05. (13 år).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* (? – 1/1)

2004 ØVRE EIKER: 1M Råen, Fiskumvannet 08-12.05. (S.Stueflotten, m.fl.).

Arten er relativt sjelden, men observeres nesten årlig i lite antall i Buskerud. De fleste observasjoner gjøres om våren fra mai til medio juni.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (77 – 11/21) **R**

2003 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 07.07. (J.T.Bollerud).

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 27.05.-12.06. | 1-5 sy (5M 11.06.) | Fiskumvannet, Øvre Eiker | S.Stueflotten, JT.Bollerud, m.fl. |
| 02.06. | 1 | Hvam, Kongsberg | H.J.Hovelstad |
| 04.06.-09.06. | 1-2 sy | Linnesstranda, Lier | J.E.Nygård, m.fl. |
| 07.06. | 1 | Steinsletta, Hole | V.Bunes |
| 07.06.+13.06. | 1 | Lore, Hole | B.H.Larsen, K.Myrmo |
| 08.06. | 1 | Bjørketangen, Hole | B.H.Larsen |
| 11.06. | 2 | Skoger, Drammen | S.Stueflotten |
| 11.06.-12.06. | 1 | Berg/Sælabonn, Hole | V.Bunes, J.T.Fossum |
| 12.06. | 5 | Linnesstranda, Lier | J.E.Nygård |
| 18.06. | 2 | Gjellum, Røyken | F.N.Bye |
| 18.06. | 1 | Helgeroa, Spikkestad, Røyken | F.N.Bye |
| 26.06. | 1 | Sætrepollen, Hurum | E.Gates |
| 27.06.-28.06. | 1-2 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud |
| 29.06. | 3 | Linnesstranda, Lier | E.Gates |
| 19.07. | 1 | Linnesstranda, Lier | E.Gates |



Myrsanger, Linnesstranda 2004. Foto: J.E.Nygård

Arten er blitt stadig vanligere i nedre Buskerud de siste årene, med rekordmange funn de siste årene. Arten ankommer Buskerud i månedsskiftet mai/juni, gjennomsnittlig ankomstdato: 29.05. (17 år).

Halsbåndfluesnapper *Ficedula albicollis* NSKF

2002 HURUM: 1 hann Sætre, primo mai* (F)
(H.Østern).

(Sørøst-Europa fra Frankrike og Italia i vest, øst til Volga i Russland, samt Gotland og Øland i Sverige). Dette er det 8. funnet av arten i Norge. Fuglen oppholdt seg på Sætre i ca. 5 dager. Fuglen ble fotografert, og heldigvis fikk en fugleinteressert person, Ole Hans Kristiansen, sett bildet og vist det til K.Myrmo som rapporterte funnet til NSKF.



Halsbåndfluesnapper, Sætre, mai 02. Foto: H.Østern

Tornskate *Lanius collurio* hekking R

2004 ÅL: 1 par m/2 juv Dokki, Fetjastølsdalen 19.07.-06.08. (T.Breiehagen).

Vanlig men heller fåtallig hekkefugl i Buskerud. Hekkefunnet 920 moh i Ål er blant de mer spesielle. Ungene ble ringmerket 06.08. LRSK ønsker rapporter om flere hekkefunn av tornskate.

Varsler *Lanius excubitor* (? – 9/9) R

2003 HEMSEDAL: Hemsila 20.09. (S.Sannes).

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 07.04.-08.04. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | J.T.Bollerud |
| 23.05. | 1 | Hostvet, Sandsvær, Kongsberg | B.R.Skullestad |
| 24.09. | 1 | Tofte, Hurum | E.Gates |
| 02.10.-07.10. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.T.Bollerud, J.T.Bollerud, T.Bakken |
| 26.10. | 1 | Lahell, Lier | J.Mjåland |
| 31.10.-08.11. | 1 | Fiskumvannet, Øvre Eiker | B.R.Skullestad, B.T.Bollerud, m.fl. |
| 10.11. | 1 | Senning, Kongsberg | F.T.Brandbu |
| 01.12. | 1 | Vestfossen, Ø.Eiker | M.Sjøblom |
| 21.12. | 1 | Verp, Skollenborg, Kongsberg | F.T.Brandbu |

Noen færre funn ble innrapportert i 2004 enn de foregående årene. De fleste observasjoner blir gjort i vinterhalvåret, september-mars.

Kornkråke *Corvus frugilegus* (? – 5/17) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| 21.02. | 1 | Rundtom, Drammen | J.Gylder |
| 24.04. | 1 | Svarstadvika, Hole | K.Myrmo, J.L.Hals, V.Ree, m.fl. |
| 23.10. | 9 | Bomenga, Hokksund, Ø.Eiker | M.Sjøblom |
| 28.10. | ca.5 | Mjøndalen, N.Eiker | T.Bakken |
| 06.12+ | 1 juv | Gomsrud, Kongsberg | B.R.Skullestad |

Arten observeres årlig i Buskerud, de fleste i vinterhalvåret fra oktober til april, normalt bare som enkeltindivider eller noen få individer (2-5) sammen.

Brunsisik *Carduelis cabaret* (? – 6/17) R

Observasjoner 2004:

| Dato | Antall | Lokalitet | Observatør |
|---------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 03.01. | 1M | Tranby, Lier | R.E.Andersen |
| 19.01. | 1F | Tranby, Lier | R.E.Andersen |
| 24.01. | 1 | Sætre, Hurum | R.E.Andersen |
| 12.04. | 4 | Miletjern, N.Eiker | M.Halmrast, M.Winness |
| 29.04.-27.05. | 1-3 | Linnesstranda, Lier | R.E.Andersen, J.E.Nygård, E.Gates |
| 25.08.-03.10. | 1-4 | Linnesstranda, Lier | R.E.Andersen, S.Stueflotten |
| 10.10. | 7-8 | Linnesstranda, Lier | R.E.Andersen, J.E.Nygård |

Arten observeres stort sett bare i vinterhalvåret i Buskerud. Brunsisik kan være vanskelig å skille fra gråsisik i felt, og arten er derfor ganske sikkert underreportert. Det diskuteres nå om denne nye arten skal endre status tilbake til underart av gråsisik igjen.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* hekk. R

2004 DRAMMEN: 1 unge Gjerpene, Drammen 30.05. (O.Fønnebø), 1 juv Bragernes 28.06. (M.Winness).

Arten har økt i antall i Buskerud i seinere år, og observeres nå stadig oftere på foringsplasser i vinterhalvåret. Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, og bare et fåtall hekkefunn er kjent.

Funn som inntil videre er plassert i kategorien ”avventes”

Sabinemåke *Larus sabini*. NSKF
2004 HURUM: Filtvet 18.09.

Ikke godkjente funn

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* NSKF
2001 ØVRE EIKER: Hals 14.08.

Svarthalsdykker *Podiceps nigricollis* NSKF
2003 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 19.09.

Skrikørn *Aquila sp.* NSKF
2003 KONGSBERG: Skollenborg 14.09.

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*
2003 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 06.05.

Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa*
2004 HURUM: Tofte 21.09.

Havørn *Haliaeetus albicilla*
2004 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 22.05.

Hybrid kanadagås x hvitkinngås
Branta canadensis x leucopsis
2004 Hurum: Storskjær 28.08.

Dvergmåke *Larus minutus*
2004 HURUM: Filtvet 19.09.

Dvergmåke *Larus minutus*
2004 ØVRE EIKER: Fiskumvannet 07.10.

Svartkråke *Corvus corone corone*
2004 ØVRE EIKER: Hals 24.04.

Rettelser til LRSK-rapport 2003

Bildet av dvergsvaner ved Røsshalmstranda i mars 2003 er tatt av V.Bunes ikke K.Myrmo.

LRSKs sammensetning

Steinar Stueflotten (sekretær), Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo.

Litteratur

Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (red.) 1977-1994. Handbook of the Birds Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. London. 9 bind.

Dale, S., Andersen, G.S., Eie, K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001. Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.

Gjershaug, J.O. m.fl. (red) 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Stueflotten, S. 2004. Sjeldne fugler i Buskerud 2003. Buskskvetten 20 (<http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm>).

Stueflotten, S. m.fl. 2003. Sjeldne fugler i Buskerud 2002. Buskskvetten 19(3): 60-74.

LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Alltid med beskrivelse:

| | |
|---|---|
| X | Observasjoner skal innrapporteres LRSK med utførlig beskrivelse. "NSKF" indikerer at LRSK videresender rapporten til behandling i NSKF, eller NSKF behandler saken direkte. |
|---|---|

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge.

Versjon 2005, gyldig fra 01.01.2006

Beskrivelse ikke nødvendig:

| | |
|---|---|
| x | Observasjoner skal innrapporteres LRSK. |
| z | Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X. |
| H | Hekkefunn skal innrapporteres LRSK. Beskrivelse av omstendighetene rundt hekking ønskes. |
| K | Kystfunn skal innrapporteres LRSK. |
| I | Innlandsfunn av arten skal innrapporteres LRSK. |
| S | Sommerfunn skal innrapporteres LRSK. |
| V | Vinterfunn skal innrapporteres LRSK. |
| O | Overnattingsplasser skal innrapporteres LRSK. |
| F | Observasjoner fra Fiskumvannet trenger ikke beskrives. |
| T | Observasjoner fra Tyrifjorden trenger ikke beskrives. |
| N | Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres LRSK. |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|
| x | Smålom | H | Vepsevåk | X | Polarjo | X NSKF | <i>L. s. cyanecula</i> |
| V | Storlom | X NSKF | Svartglente | X | Tyvjo | X | Svartrødstjert |
| X | Islom | X | Glente | X | Fjelljo | X | Svartstrupe |
| X | Gulnebbloom | X NSKF | Båndhavørn | X | Storjo | V | Måltrost |
| x | Dvergdykker | X | Havørn | X | Dvergmåke | V | Duetrost |
| H | Toppsykker | x | Sivhauk | X NSKF | Sabinemåke | X F | Gresshoppesanger |
| X | Gråstrupedykker | x | Myrhauk | V | Sildemåke | X NSKF | Elvesanger |
| x | Horndykker | X NSKF | Steppehauk | X | Grønlandsmåke | X | Sivsanger |
| X NSKF | Svarthalsdykker | V | Musvåk | X | Polarmåke | X NSKF | Busksanger |
| X NSKF | Svartbrynalbatross | V | Fjellvåk | x | Krykkje | z | Myrsanger |
| X NSKF | Gråhodealbatross | X NSKF | Steppeørn | X NSKF | Rovterne | X NSKF | Trostesanger |
| x | Havhest | x N | Kongeørn | X | Splitterne | X | Hauksanger |
| X NSKF | Storlire | H | Fiskeørn | XN/H | Rødnebbterne | V | Munk |
| X | Grålire | V | Tårnfalk | X NSKF | Dvergterne | X NSKF | Østsanger |
| X | Havlire | X NSKF | Aftenfalk | X | Svartterne | X NSKF | Fuglekongesanger |
| x | Havsule | V | Dvergfalk | I | Lomvi | X | Gulbrynsanger |
| V | Storskarv | x | Lerkefalk | X | Polarlomvi | V | Gransanger |
| X | Toppskarv | x | Jaktfalk | I | Alke | X NSKF | <i>Phyl. c. tristis</i> |
| X NSKF | Rørdrum | V | Vandrefalk | x | Teist | X NSKF | Rødtoppfuglekonge |
| X NSKF | Egretthege | X | Rapphøne | I | Alkekonge | X | Dvergfluesnapper |
| H | Gråhege | z | Vaktel | x | Lunde | X NSKF | Halsbåndfluesnapper |
| X NSKF | Stork | z | Vannrikse | X NSKF | Steppehøne | X | Skjeggmeis |
| X NSKF | Bronseibis | z | Myrrikse | H | Skogdue | X | Lappmeis |
| X NSKF | Skjestork | z | Åkerrikse | X | Turteldue | X | Pirol |
| X | Dvergsvane | x | Sivhøne | X | Hubro | X NSKF | Rødhalevarsler |
| SH | Sangsvane | H | Trane | X | Snøugle | H | Tornskate |
| X FT | Sædgås | V | Tjeld | x | Haukugle | x | Varsler |
| x | Kortnebbgås | H | Dverglo | X | Slagugle | K | Lavskrike |
| X | Tundragås | V | Sandlo | X | Lappugle | H | Nøttekråke |
| H | Grågås | x | Boltit | VH | Hornugle | X | <i>Sibirnøttekråke</i> |
| x | Stripegås | V | Heilo | VH | Jordugle | x | Kornkråke |
| x | Snøgås | x | Tundralo | x | Nattravn | X | Svartkråke |
| x | Hvitkinggås | V | Vipe | x | Isfugl | X NSKF | Rosenstær |
| X | Ringgås | x | Polarsnipe | X NSKF | Bieter | X NSKF | Gulirisk |
| X NSKF | Rustand | x | Sandløper | X NSKF | Blåråke | H | Stillits |
| X NSKF | Niland | x | Dvergsnipe | x | Hærfugl | V | Tornirisk |
| IV | Gravand | x | Temmincksnipe | H | Gråspett | V | Bergirisk |
| x | Mandarinand | X | Tundrasnipe | X | Hvitryggspett | x | Brunsisik |
| H | Brunnakke | x | Fjæreplytt | H | Dvergspett | X | Polarsisik |
| X | Snadderand | V | Myrsnipe | X NSKF | Topplerke | X | Båndkorsnebb |
| X NSKF | Amerikakrikkand | X | Fjellmyrløper | X | Trelerke | H | Grankorsnebb |
| VH | Stjertand | V | Brushane | x | Fjellerke | H | Furukorsnebb |
| x | Knekkand | X | Kvartbekkasin | O | Låvesvale | H | Rosenfink |
| x | Skjeand | x | Dobbeltbekkasin | V | Heipiplerke | x | Konglebit |
| X NSKF | Rødhodeand | V | Rugde | X | Lappiplerke | H | Kjernebiter |
| x | Taffeland | X | Svarthalespove | x | Skjærpiplerke | X | Hortulan |
| VH | Bergand | X | Lappspove | X | Sørlig gulerle | X | Vierspurv |
| I | Ærfugl | H | Småspove | X | Engelsk gulerle | X | Dvergspurv |
| x | Havelle | H | Storspove | X | Svarttryggerle | X NSKF | Svarthodespurv |
| VH | Svartand | x | Sotsnipe | V | Jernspurv | | |
| x | Sjørørre | x | Steinvender | H | Nattergal | | |
| x | Lappfiskand | x | Svømmesnipe | X NSKF | Sørnattergal | | |
| X NSKF | Stivhaleand | X NSKF | Polarsvømmesnipe | K | Blåstrupe | | |